

На Сахалине и Курильских островах филины наблюдали среди хвойных или смешанных лесов куртинного характера. Густых, темных хвойных лесов он избегает, предпочитая прогалины, берега больших озер и рек.

Кладка яиц происходит в первой декаде марта; птенцы появляются в апреле. Пищей филину служат зайцы, белки, бурундуки, вороны, белые куропатки, водоплавающие птицы. В желудке добытой нами 29 сентября 1951 г. самки были остатки рыжей полевки. На Курильских островах и в южной части Сахалина филин питается крысами, которые живут вне жилых построек.

Самка, добытая нами 29 сентября, не закончила линьки: на брюшной части тела мелкое перо было в пеньках.

184. Курильский рыбный филин. *Ketupa zeylonensis* Gmelin

Гнездится, живет оседло на Сахалине и южных островах Курильской гряды (Кунашире, Итурупе и Шикотане).



Рис. 55. Курильский рыбный филин

На Сахалине отмечен нами на берегу р. Найбути 17 июля 1947 г.; в устье этой реки птица поздно вечером охотилась на проходную горбушу. Ранее рыбный филин добывался близ населенных пунктов — Лесо-заводска (б. Сиритори) и Лазо.

На Курильских островах мы его отмечали 27 августа 1948 г. на о-ве Шикотане, по речке, впадающей в бухту Инемусири. Довольно обычен по мелким речкам на о-ве Кунашире, особенно в окрестностях с. Серноводска и оз. Тофицу. 13 и 14 сентября 1948 г. один филин был отмечен близ заброшенной рыбообразной станции у оз. Тофицу. Л. А. Портенко нашел перо рыбного филина в окрестностях с. Серноводска в сентябре 1948 г.

На о-ве Кунашире рыбный филин держится по берегам мелких речек и озер в густом хвойном лесу из пихты и ели с примесью дуба и тисса. На Шикотане мы его случайно выгнали днем из густой заросли прибрежных ивняков. На Сахалине держится по берегам больших рек и рыбообразных прудов, окруженных густыми елово-пихтовыми старыми лесами.

На Кунашире у Южно-Курильска в апреле было найдено гнездо рыбного филина с птенцом (Bergman, 1935). В середине октября тот же автор слышал крики филинов в лесу у пос. Алехина на западном берегу Кунашира.

**185. Ошейниковая совка. *Otus bakkamoena semitorques*
Temminck et Schlegel**

Экземпляры: 1) 21.XI 1948 г., пол не определен, о-в Кунашир, южнее с. Южно-Курильска, 5 км по берегу моря, сбор Гизенко.

Гнездится, живет оседло; встречается редко, только на южных островах Курильской гряды.



Рис. 56. Ошейниковая совка

Ошейниковая совка найдена на о-ве Кунашире дважды. У нас в коллекции было лишь крыло от птицы. Бергман (Bergman, 1935) добыл самца 18 октября 1930 г. близ пос. Алехина. В густом пихтовом лесу на юго-западном берегу бухты Сякотан (о. Шикотан) 23 августа 1948 г. мы

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
САХАЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ

A. I. Gizenko
A. U. Tuzenko

^р ^т ^и ^{тс} ^у
П Т И Ц Ы
^с ^а ^к ^а ^л ^и ^н ^с ^к ^о ^й
САХАЛИНСКОЙ
^о ^б ^л ^а ^с ^т ^и
ОБЛАСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА · 1955